


1745 – Grotta Francesco Stradi o Grotta presso Nivize

Descrizione

La grotta presso Nivize ha un'imboccatura posta nell'ambito di una piccola depressione su fondo roccioso. La vegetazione circostante è rappresentata dalla tipica boscaglia carsica (1) mentre nella depressione si osservano individui di *Corylus avellana* e *Cornus mas* e poco sottobosco a causa della elevata rocciosità affiorante (2). L'area attigua all'imboccatura è interessata dalla vegetazione a felci e muschi. In questa cavità si nota l'influenza dell'esposizione. Infatti la porzione a nord (3a), più fresca, è molto più ricca di muschi e edera. Il rilevamento è pertanto differenziato in porzione a nord (3a) e porzione a sud (3b).



Rilievo 3a

Copertura totale: 90

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Hedera helix | 5 |
| Helleborus odorus v. istriacus | 2 |
| Lamium montanum | 1 |
| | |
| Muschi tot | 80 |

Rilievo 3b

Copertura totale: 50

| | |
|------------------------|-----------|
| Fraxinus ornus | 5 |
| Hedera helix | 2 |
| Asplenium trichomanes | 2 |
| Sesleria autumnalis | 2 |
| Verbascum cfr. thapsus | 1 |
| Arabis thaliana | 1 |
| | |
| Muschi tot | 40 |
| Anomodon viticulosus | 35 |
| Altri muschi | 5 |



1745-Rilievo 3b